


CHARLEVOIX

PODZOL HUMO-FERRIQUE ORTHIQUE
Classification taxonomique (sous-groupe)

www.
irda.
qc.ca

FICHE DE DESCRIPTION
ET D'INTERPRÉTATION
DES SÉRIES DE SOLS
DU QUÉBEC




Matériau et réaction

Till loameux-grossier
(gneiss, diorite), acide

Drainage	Perméabilité	Eau utile	Ruissellement
Très rapide	Très lente	Très basse	Très rapide
Rapide	Lente	Basse	Rapide
Bon	Modérée	Modérée	Modéré
Modérément bon	Rapide	Élevée	Lent
Imparfait	Très rapide	Très élevée	Très lent
Mauvais			Nul (stagnant)
Très mauvais			

Profil cultivé typique	Horizon	Texture et qualificatif	Couleur	Marbrures	Structure	Consistance
COUCHE DE SURFACE	Ap	LSF grca, LS grca	Brun foncé à brun	Absentes	Granulaire à poly.sub., fine à moyenne, modéré	Très friable
SOUS-SOL (PARTIE SUPÉRIEURE)	Bf	LS grca, LSF grca	Brun jaunâtre foncé à brun jaunâtre, brun orange	Absentes	Granulaire, fine à moyenne, faible	Très friable
SUBSTRATUM	C	LS grca, SL grca	Brun à brun jaunâtre foncé	Absentes	Amorphe	Ferme à très ferme



Travaux d'aménagement requis	
■	Épierreage
■	Drainage superficiel
■	Drainage souterrain
■	Fertilisation et chaulage
■	Conservation de l'eau et irrigation

Problèmes liés aux travaux de drainage	
■	Instabilité des berges
■	Remontée de fragments
■	Colmatage physique
■	Colmatage ferrique

Types de dégradation à surveiller sous une utilisation intensive	
■	Compaction
■	Battance
■	Perte de matière organique
■	Acidification
■	Érodibilité
■	Érosion hydrique
■	Érosion éolienne

LÉGENDE ■ Faible ■ Moyen ■ Élevé

CLASSE DE
POSSIBILITÉ
D'UTILISATION
AGRICOLE

5PMT

CHARLEVOIX

PODZOL HUMO-FERRIQUE ORTHIQUE
Classification taxonomique (sous-groupe)


Analyses physiques

PROFIL CULTIVÉ REPRÉSENTATIF	Horizon	Texture et qualificatif	Fragments	Fraction des sables				Sable (%)	Limon (%)	Argile (%)	Densité app. (g/cm ³)	Cond. hydraulique (cm/hr)
			(% en volume)	SG (%)	SM (%)	SF (%)	STF (%)					
COUCHE DE SURFACE	Ap	LS gr	15	—	—	—	—	76,0	15,0	9,0	1,17	2,38
SOUS-SOL (PARTIE SUPÉRIEURE)	Bf	LSF gr	15	—	—	—	—	71,0	18,0	11,0	1,32	1,83
SUBSTRATUM	C	SL gr	25	—	—	—	—	82,0	11,0	7,0	1,80	0,25

Analyses chimiques

PROFIL CULTIVÉ TYPIQUE	Horizon	Moyenne : Min. - max. :	pH eau	M. org. (%)	CEC	Ca	Mg	K	Na	P ass.
					(mEq/100 g)	(mg/Kg)				
COUCHE DE SURFACE	Ap1	Moyenne : Min. - max. :	5,9 5,2 - 6,6	7,54 6,0 - 9,6	20,97 17,4 - 26,0	1262,6 326 - 2907	110,0 16 - 197	87,1 39 - 277	8,8 2 - 18	27,5 9 - 61
	Ap2	Moyenne : Min. - max. :	5,8 5,3 - 6,3	5,91 4,9 - 7,0	17,94 15,1 - 19,4	736,8 212 - 1237	62,4 11 - 149	34,5 16 - 49	7,1 2 - 11	12,2 5 - 20
SOUS-SOL (PARTIE SUPÉRIEURE)	Bf	Moyenne : Min. - max. :	6,0 5,4 - 6,4	3,71 2,4 - 5,8	14,98 11,2 - 18,4	488,4 104 - 1117	37,8 3 - 78	38,4 11 - 204	6,8 2 - 14	10,8 6 - 16

Répartition géographique



Utilisation des sols

Principales cultures associées à la série de sols	Superficie
	Proportion
Autres cultures	54,07 %
Prairie et pâturage	30,52 %
Céréales	13,53 %
Maïs, soya, canola et protéagineuses	1,53 %
Maraîchères, petits fruits et légumes de transformation	0,35 %
Pomme de terre	0,00 %
Vergers	0,00 %
Superficie totale	4 383 ha

Source: La Financière agricole du Québec, Base de données des parcelles et productions agricoles déclarées (BDPPAD), 2018 à 2022. <https://www.fadq.qc.ca/documents/donnees/base-de-donnees-des-parcelles-et-productions-agricoles-declarees/>

Séries de sols semblables	Éléments distinctifs
La Mare	Podzol gleyifié, drainage imparfait
Baie-Saint-Paul	Gleysol, loameux-fin, drainage mauvais
Miche	Matériau de till dominant (granite, muscovite)

POUR EN SAVOIR D'AVANTAGE

Catherine Bossé
Chargée de projets en pédologie
418 643-2380, poste 405
pedologie@irda.qc.ca

PARTENAIRES DE RÉALISATION ET DE FINANCEMENT